



Pacientes
Colegios
Sociedades
Reportajes
Opinión
Archivo
Foros

Nº 636 Sábado, 13 de Marzo de 2010

Buscador por palabra clave:

Buscar

Inicio

Noticias

Defienden la cirugía en diabéticos tipo 2 con sobrepeso



El concepto de cirugía de la diabetes, conocido desde hace más de 15 años por los cirujanos de la obesidad, toma cuerpo en la actualidad para ayudar a solucionar la diabetes en determinados supuestos

Madrid, 12 marzo 2010 (medicosypacientes.com)

Los cirujanos y endocrinólogos están cada vez más convencidos de aplicar la cirugía a diabéticos tipo 2 con sobrepeso, en los que el tratamiento convencional con dieta, ejercicio y medicación son insuficientes para conseguir un control adecuado de sus niveles de azúcar en sangres, o les resulta imposible seguir las indicaciones de su médico.

Con el optimismo de los resultados que se van obteniendo, pero con la prudencia de ofrecer a los pacientes la mejor alternativa, el doctor Joaquín Resa, responsable de la Unidad de Cirugía Laparoscópica de la Obesidad Mórbida en la Clínica Montpellier de Zaragoza, se mostró "defensor de las técnicas de bypass por laparoscopia, las cuales suponen un derivación del intestino, apartando una parte importante del mismo, del camino de la comida".

"Este tipo de intervenciones funciona porque se absorbe menos azúcar, se adelgaza y la llegada más rápida de la comida a tramos distales del intestino delgado proporcionan cambios hormonales que mejoran la acción de la insulina y el funcionamiento del páncreas", explicó Resa.

Además, el adelgazamiento disminuye la resistencia de las células a la acción de la insulina, y soluciona otros problemas como el colesterol elevado, la hipertensión o el síndrome de apnea sueño, implicados en la

producción infartos.

En el transcurso de su exposición en el transcurso del Congreso Nacional de Cirugía de la Obesidad y del Metabolismo celebrado en Valencia, mostró "el seguimiento de 12 pacientes con sobrepeso, no obesos mórbidos indicados por su diabetes", y pudo demostrar que la mejoría de los índices de azúcar en sangre se producen casi inmediatamente después de la cirugía, siendo muy manifiesta en los tres primeros meses y rotunda a los seis meses.

Entre el tercer y sexto mes, señaló Resa, "el 75% de los pacientes dejaron de precisar medicación, incluida la insulina. Entre el sexto y duodécimo mes el 100% de los pacientes operados, en este grupo bien seleccionados, no precisaban ningún tipo de tratamiento para la diabetes".

La ponencia concluyó con el convencimiento de los científicos de que la cirugía metabólica se implantará poco a poco, en casos seleccionados, tratados por cirujanos muy entrenados en cirugía de la obesidad para dar la máxima seguridad a los pacientes.

medicosypacientes.com

Aviso legal
¿Quiénes somos?